

## **PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE**

### **Bronchostop sirup**

Léčivé látky: suchý tymiánový extrakt, tekutý proskurníkový extrakt

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

#### **Co naleznete v této příbalové informaci**

1. Co je přípravek Bronchostop a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bronchostop užívat
3. Jak se přípravek Bronchostop užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Bronchostop uchovávat
6. Obsah balení a další informace

### **1. CO JE PŘÍPRAVEK BRONCHOSTOP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ**

Bronchostop je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný ke zmírnění podráždění hltanu a souvisejícího suchého kašle a na podporu vykašlávání viskózního hlenu při kašli spojeném s nachlazením.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

### **2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BRONCHOSTOP UŽÍVAT**

**Neužívejte přípravek Bronchostop**

- jestliže jste alergický(á) na suchý tymiánový extrakt, tekutý proskurníkový extrakt, na jiné rostliny z čeledi hluchavkovitých (*Lamiaceae*), nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

### **Upozornění a opatření**

Před použitím přípravku Bronchostop se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Máte-li horečku, dušnost nebo hnisavý hlen, musíte se poradit s lékařem.

### **Děti**

Použití u dětí ve věku do 2 let se nedoporučuje kvůli nedostatku údajů a protože je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

### **Další léčivé přípravky a přípravek Bronchostop**

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Není známo žádné vzájemné působení s jinými léčivými přípravky.

### **Těhotenství a kojení**

Vzhledem k absenci dostatečných údajů se užívání během těhotenství a kojení nedoporučuje.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

### **Plodnost**

Údaje o vlivu na plodnost u člověka nejsou k dispozici.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

**Přípravek Bronchostop obsahuje methylparaben a propylparaben** jako konzervační látky. Mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné) (viz „Neužívejte přípravek Bronchostop“).

**Přípravek Bronchostop obsahuje xylitol** (4,61 g xylitolu/15 ml), který může mít projímavý účinek. Energetická hodnota xylitolu je 2,4 kcal/g.

## **3. JAK SE PŘÍPRAVEK BRONCHOSTOP UŽÍVÁ**

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

### *Dávkování*

#### Dospělí a dospívající nad 12 let:

15 ml každé 3 až 4 hodiny (4 až 6 krát denně; maximální denní dávka 90 ml)

#### Děti 4-12 let:

7,5 ml každé 3 až 4 hodiny (4 až 6 krát denně; maximální denní dávka 45 ml)

#### Děti 2-4 roky:

Po poradě s lékařem lze podávat 7,5 ml každé 3 až 4 hodiny (4 až 6 krát denně; maximální denní dávka 45 ml).

#### Děti do dvou let:

Použití u dětí ve věku do 2 let se nedoporučuje kvůli nedostatku údajů a protože je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

#### *Způsob podání:*

Pro perorální podání (podání ústy).

Užívejte přípravek Bronchostop neředěný. Výše uvedenou dávku odměřte pomocí přiložené odměrky se stupnicí od 2,5 ml do 20 ml.

V případě potřeby můžete přípravek Bronchostop rozředit ve vodě nebo teplém čaji.

#### *Doba užívání:*

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

#### **Jestliže jste užil(a) více přípravku Bronchostop, než jste měl(a)**

Jestliže jste užil(a) mnohem vyšší dávku tohoto léčivého přípravku, než jste měl(a), mohou se u vás projevit mnohem intenzivněji příznaky známých nežádoucích účinků. V tomto případě je prosím oznamte svému lékaři. Lékař může dle potřeby rozhodnout o požadovaných opatřeních.

#### **Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bronchostop**

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

## **4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V souvislosti s léčivými přípravky obsahujícími tymián byly pozorovány reakce z přecitlivělosti a poruchy trávicího traktu. Jejich frekvence není známa.

#### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

*Státní ústav pro kontrolu léčiv*

*Šrobárova 48*

*100 41 Praha 10*

*webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)*

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## 5. JAK PŘÍPRAVEK BRONCHOSTOP UCHOVÁVAT

Neotevřený léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po použití lahvičku dobře uzavřete. Po otevření lahvičky spotřebujte obsah do 4 týdnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

### Co přípravek Bronchostop obsahuje

Léčivými látkami jsou:

1 ml přípravku obsahuje:

7,8 mg extraktu (ve formě suchého extraktu) z *Thymus vulgaris* L. a *Thymus zygis* L., herba (tymiánová nať) (7-13:1). Extrakční rozpouštědlo: voda.

55,3 mg extraktu (ve formě tekutého extraktu) z *Althaea officinalis* L., radix (proskurníkový kořen) (1:12-14). Extrakční rozpouštědlo: voda.

Pomocnými látkami jsou:

xylitol

methyparaben

propylparaben

malinová šťáva

malinové aroma(obsahuje propylenglykol (E 1520))

xanthanová klovatina

monohdrát kyseliny citronové (E 330)

maltodextrin

arabská klovatina

čištěná voda

### Jak přípravek Bronchostop vypadá a co obsahuje toto balení

Bronchostop je hnědočervená viskózní tekutina s vůní a chutí tymiánu a malin. Plní se do lahviček z hnědého skla, uzavřených šroubovacím uzávěrem, o objemu 120 ml a 200 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Příložená odměrka se stupnicí od 2,5 ml do 20 ml usnadňuje přesné odměření doporučeného množství.

### Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21

Vídeň 1160  
Rakousko

**Tato příbalová informace byla naposledy schválena 26. 9. 2018.**